




EpioxaTM
(riboflavin 5'-phosphate
ophthalmic solution)



**Epioxa es el único tratamiento de
entrecruzamiento corneal no invasivo,
con epitelio intacto, aprobado por la
FDA para el queratocono (KC)**

INFORMACIÓN SOBRE EL KC Y EPIOXA

FDA = Administración de Alimentos y Medicamentos.

**Consulte la Información de seguridad importante en la contraportada
y la Información de prescripción completa en [Epioxa.com](https://www.epioxa.com).**

El queratocono (KC) es una enfermedad ocular progresiva que amenaza la visión

En el KC, la córnea (la parte frontal redonda y transparente del ojo) se debilita y adelgaza. Se vuelve más pronunciada, adquiriendo forma de cono, lo que provoca una visión borrosa o distorsionada.

ALGUNOS DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL KC SON:

- ◆ Frotarse los ojos con frecuencia.
- ◆ Visión borrosa.
- ◆ Dificultad para ver de noche.
- ◆ Dolores de cabeza frecuentes.
- ◆ Cambios frecuentes en la graduación de anteojos o lentes de contacto debido al empeoramiento de la visión.
- ◆ Visión que no puede corregirse completamente con lentes de prescripción (anteojos o lentes de contacto).
- ◆ Antecedentes familiares de KC.

NO PIERDA DE VISTA SU FUTURO

En una encuesta realizada a personas con KC que experimentaron progresión de la enfermedad con el tiempo, informaron que perdieron o tuvieron que abandonar:



Oportunidades laborales y ascensos



Estudios universitarios



Pasatiempos como pintar, dibujar, leer música y practicar deportes



Conducir de noche


Un tratamiento denominado **entrecruzamiento corneal**, que utiliza gotas para los ojos de venta bajo receta, luz UV y oxígeno para fortalecer la córnea, puede evitar que el KC empeore y siga afectando su vida.

EL TRATAMIENTO EPIOXA CON EPITELIO INTACTO ESTÁ DISEÑADO PARA MEJORAR LA COMODIDAD Y EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Epioxa es el primer y único tratamiento de entrecruzamiento corneal no invasivo aprobado por la FDA

El tratamiento con Epioxa no es invasivo porque no elimina la capa externa de la córnea llamada epitelio.

El tratamiento con Epioxa tiene 3 pasos



1 Aplicación de las gotas oftálmicas

El médico aplicará las gotas para los ojos durante unos minutos.



2 Colocación de las Boost Goggles® y verificación del flujo de oxígeno

A continuación, el médico colocará las gafas y activará el oxígeno para que fluya dentro de ellas.




3 Entrecruzamiento corneal con luz UV

La fuente de luz especial emite luz UV que, en combinación con las gotas oculares y el oxígeno, fortalece la córnea.

FDA = Administración de Alimentos y Medicamentos; UV = ultravioleta.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes fueron ojos rojos, opacidad corneal, sensibilidad a la luz, alteración de las células superficiales de la córnea, dolor ocular, irritación ocular, lagrimeo, hinchazón del párpado, líneas blancas finas en la córnea, disminución de la agudeza visual, sequedad ocular e inflamación ocular.




Consulte la Información de seguridad importante en la contraportada y la Información de prescripción completa en Epioxa.com.

El tratamiento con Epioxa puede detener la progresión de queratocono (KC)


El tratamiento con Epioxa se estudió en 2 ensayos clínicos que incluyeron casi 600 ojos de personas con KC de entre 13 y 55 años de edad.

Al inicio de cada ensayo,
los médicos midieron la inclinación de la curvatura corneal de cada participante para determinar la severidad de su KC.




Antes del tratamiento

Al final de cada ensayo,
los médicos midieron cuánto había cambiado la curvatura corneal.



Tratamiento con Epioxa

Detiene o aplana el aumento de la curvatura.



Sin tratamiento activo

La inclinación de la curvatura aumentó y el KC progresó.

LA PROGRESIÓN DEL KC PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LA VISIÓN



Epioxa™
(riboflavin 5'-phosphate
ophthalmic solution)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes fueron ojos rojos, opacidad corneal, sensibilidad a la luz, alteración de las células superficiales de la córnea, dolor ocular, irritación ocular, lagrimeo, hinchazón del párpado, líneas blancas finas en la córnea, disminución de la agudeza visual, sequedad ocular e inflamación ocular.

Consulte la Información de seguridad importante en la contraportada y la Información de prescripción completa en Epioxa.com.

Se demostró la seguridad del tratamiento con Epioxa en 2 ensayos clínicos

LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES FUERON LEVES Y TEMPORALES:

- ◆ Ojos rojos.
- ◆ Opacidad corneal.
- ◆ Sensibilidad a la luz.
- ◆ Alteración de las células superficiales de la córnea.
- ◆ Dolor ocular.
- ◆ Irritación ocular.
- ◆ Lagrimeo.
- ◆ Hinchazón del párpado.
- ◆ Líneas blancas finas en la córnea.
- ◆ Disminución de la agudeza visual.
- ◆ Sequedad ocular.
- ◆ Inflamación ocular.

ALGUNAS PERSONAS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS RECIBIERON TRATAMIENTO EN EL SEGUNDO OJO TAN PRONTO COMO UNA SEMANA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DEL PRIMER OJO

KC = queratocono.



Qué esperar después del tratamiento de entrecruzamiento corneal de Epioxa

- ◆ Puede sentir cierta molestia en el ojo tratado.
- ◆ Usar anteojos de sol puede ayudar si presenta sensibilidad a la luz después del tratamiento.
- ◆ Regrese a casa y descanse.
- ◆ **No se frote los ojos.**
- ◆ Tome cualquier medicamento que le haya recetado su médico.

Lo más probable es que continúe usando anteojos o lentes de contacto para corregir la visión después de recibir tratamiento con Epioxa si ya los utilizaba antes del procedimiento.

Comuníquese con su médico de inmediato si experimenta dolor severo en el ojo tratado o cualquier disminución repentina de la visión.

El KC puede empeorar con el tiempo y provocar una pérdida significativa de la visión. Los anteojos graduados y los lentes de contacto no detienen la progresión del KC. Si no se trata, un trasplante de córnea invasivo puede ser la única opción.

Trate el KC antes de que sea demasiado tarde

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes fueron ojos rojos, opacidad corneal, sensibilidad a la luz, alteración de las células superficiales de la córnea, dolor ocular, irritación ocular, lagrimeo, hinchazón del párpado, líneas blancas finas en la córnea, disminución de la agudeza visual, sequedad ocular e inflamación ocular.

Consulte la Información de seguridad importante en la contraportada y la Información de prescripción completa en Epioxa.com.

Nos comprometemos a apoyarlo durante todo su tratamiento

EpioxaCareConnect™ es el único lugar donde encontrará toda la ayuda que necesita

CONÉCTESE CON NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO DE APOYO AL PACIENTE QUE PUEDE AYUDARLO A:



Comprender el tratamiento con Epioxa y cómo funciona, sus posibles beneficios y riesgos, cómo es el procedimiento y mucho más.



Programar una cita e **iniciar una conversación** con su oftalmólogo sobre el tratamiento con Epioxa.



Obtener ayuda para encontrar un Centro de detección de queratocono o un Centro de tratamiento Epioxa en su zona.



Sentirse acompañado con seguimientos frecuentes por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.



Escanee el código QR o llame al 844-621-0666 para comunicarse con el equipo de EpioxaCareConnect

**PUEDE PAGAR TAN SOLO \$0*
POR EL TRATAMIENTO CON EPIOXA**

* Para personas elegibles con seguro médico comercial.
KC = queratocono.



Epioxa™
(riboflavin 5'-phosphate
ophthalmic solution)

¿Tiene preguntas sobre Epioxa?

Preguntas frecuentes sobre Epioxa

P. ¿QUÉ ES EPIOXA?

- ◆ Epioxa es el único tratamiento de entrecruzamiento corneal con epitelio intacto y enriquecido con oxígeno aprobado por la FDA para el queratocono.

P. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EPIOXA DE OTROS TRATAMIENTOS PARA EL QUERATOCONO?

- ◆ Epioxa es el primer y único tratamiento de entrecruzamiento corneal con epitelio intacto aprobado por la FDA para tratar el queratocono.

P. ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EPIOXA?

- ◆ Epioxa está aprobado para tratar el queratocono en adultos y pacientes pediátricos de 13 años o más.

P. ¿ES EPIOXA SEGURO Y EFICAZ PARA TRATAR EL QUERATOCONO?

- ◆ Sí. La seguridad y eficacia de Epioxa se evaluaron en 2 ensayos clínicos prospectivos, multicéntricos, aleatorizados, con una asignación 2:1 y controlados con procedimiento simulado/placebo, y fue aprobado por la FDA para el tratamiento del queratocono en adultos y pacientes pediátricos de 13 años o más. Para obtener información completa, consulte la Información de prescripción completa en Epioxa.com y hable con su médico.

SI TIENE MÁS PREGUNTAS SOBRE EPIOXA, HABLE CON SU MÉDICO O VISITE EPIOXA.COM/SUPPORT-AND-RESOURCES

Trate su queratocono (KC) ahora con Epioxa

El tratamiento oportuno es fundamental para detener la progresión del queratocono antes de que ocurra una mayor pérdida de la visión.

- ◆ Si no se trata, el KC puede causar ceguera legal.
- ◆ El tratamiento con Epioxa es diferente. Es la primera y única terapia de entrecruzamiento corneal aprobada por la FDA que funciona sin remover el epitelio, la capa externa de la córnea.
- ◆ El tratamiento con Epioxa está diseñado para ofrecer mayor comodidad y reducir el tiempo de recuperación.
- ◆ Hay asistencia gratuita disponible a través de EpioxaCareConnect™.

Pregúntele a su médico sobre el tratamiento con Epioxa. Porque conservar la visión que tiene hoy puede ayudarlo a enfocarse en un futuro más claro mañana.

FDA = Administración de Alimentos y Medicamentos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes fueron ojos rojos, opacidad corneal, sensibilidad a la luz, alteración de las células superficiales de la córnea, dolor ocular, irritación ocular, lagrimeo, hinchazón del párpado, líneas blancas finas en la córnea, disminución de la agudeza visual, sequedad ocular e inflamación ocular.

Consulte la Información de seguridad importante en la contraportada y la Información de prescripción completa en Epioxa.com.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes fueron ojos rojos, opacidad corneal, sensibilidad a la luz, alteración de las células superficiales de la córnea, dolor ocular, irritación ocular, lagrimeo, hinchazón del párpado, líneas blancas finas en la córnea, disminución de la agudeza visual, sequedad ocular e inflamación ocular.

No debe someterse al procedimiento de entrecruzamiento del colágeno corneal EPIOXA™ si tiene hipersensibilidad conocida a cualquiera de los ingredientes del producto, si se ha sometido a una cirugía de cataratas y no recibió un lente intraocular o si recibió una lente intraocular que no bloquea la luz UV, si tiene antecedentes de queratitis herpética o si está embarazada.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con su médico.

Para obtener la información de prescripción completa, visite www.epioxa.com.

Se le recomienda informar todos los efectos secundarios a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede llamar a Glaukos al 1-888-404-1644.

USOS APROBADOS

El procedimiento de entrecruzamiento del colágeno corneal EPIOXA lo realiza el oftalmólogo para el tratamiento del queratocono. No requiere la extracción del epitelio corneal (la capa más externa de la parte frontal del ojo). Consiste en EPIOXA™ HD (solución oftálmica de riboflavina 5'-fosfato) al 0,239 % y EPIOXA™ (solución oftálmica de riboflavina 5'-fosfato) al 0,177 %, que son gotas oftálmicas de venta bajo receta utilizadas en combinación con el sistema O₂n™ y las Boost Goggles®.

El procedimiento de entrecruzamiento del colágeno corneal EPIOXA está indicado para el tratamiento de queratocono en pacientes adultos y pediátricos de 13 años o más.



Para obtener más información sobre el KC y Epioxa, visite Epioxa.com

KC = queratocono.